

定期予防接種一覧表(種類・対象年齢等)



予防接種	予防する病気	対象年齢 (公費で接種できる期間)		望ましい時期 (標準的な接種年齢)	回数
ロタウイルス ワクチン	ロタウイルス 感染	ロタテック	生後6週～32週	生後6週～生後32週	3回
		ロタリックス	生後6週～24週	生後6週～生後24週	2回
		どちらのワクチンを接種するかはかかりつけ医にご相談ください。 ＊初回接種は生後6週～14週6日までに接種してください。			
★ヒブ	インフルエンザ 菌b型感染	初回	生後2か月	生後2か月～7か月未満	3回
		追加	～5歳未満	初回終了後7か月～13か月	1回
★小児肺炎 球菌	肺炎球菌感染	初回	生後2か月	生後2か月～7か月未満	3回
		追加	～5歳未満	初回の3回目から60日以上 (生後12か月～15か月)	1回
B型肝炎	B型肝炎	出生直後～1歳未満		生後2か月～8か月	3回
		＊3回目は1回目から139日以上の間隔を置いて接種			
4種混合	ジフテリア 百日咳・破傷風 ポリオ	1期 初回	3か月 ～7歳半未満	3か月～1歳未満	3回
		1期 追加		初回3回目終了後、1年～1年半	1回
BCG	結核	生後直後～1歳未満		生後5か月～8か月未満	1回
水痘	水ぼうそう	1回目	満1歳～3歳未満	1歳～1歳3か月	1回
		2回目		初回終了後6～12か月	1回
MR	麻疹 風疹	1期	満1歳～2歳未満	満1歳～2歳未満	1回
		2期	保育所・幼稚園年長児(就学前1年間)		1回
日本脳炎	日本脳炎	初回	6か月～7歳半未満	3歳～4歳	2回
		1期 追加		4歳～5歳 (初回2回目終了後、6月以上 標準的には概ね1年後)	1回
		2期	9歳～13歳未満	小学校4年生	1回
二種混合 (DT)	ジフテリア 破傷風	2期	11歳～13歳未満	小学校6年生	1回
子宮頸がん	子宮頸がん	小学6年生～高校1年生 の女子		中学1年生の女子	3回

令和2年10月現在

・★印の予防接種は、接種開始月齢により接種回数が異なります。