


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では10～11℃台、的矢湾では12～13℃台、英虞湾では12.6℃でした。
- 水深2mの日平均水温は、鳥羽海域では、1月中旬まで降温傾向でしたが、1/20前後で数日間の昇温がみられ、その後は再び降温～横ばいとなっています。的矢では、1/16～1/18に約4℃昇温し、その後は降温傾向でしたが、再び2/11～2/15の4日間で約2℃昇温しました。
- 珪藻類は、的矢湾では、的矢(2m)で70細胞/mL、三ヶ所(2m)で50細胞/mLが確認され、1月に比べ、わずかに増加しました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明
月日		2/13							2/15		2/19
時刻		13:15	13:36	13:53	14:03	14:55	14:26	15:02	11:09	10:08	10:15
水深 (m)		19.5	9.0	15.3	17.7	7.7	7.3	9.8	14.5	9.0	5.0
水温 (℃)	0.5m	10.1	10.3	10.7	10.1	11.4	11.1	11.9	13.1	12.5	13.8
	2m	10.1	10.3	10.7	10.1	11.6	11.1	11.9	13.8	12.7	12.6
	5m	10.1	10.3	10.7	10.1	11.8	11.5	11.8	14.8	12.9	
	B-1m	10.2	10.3	10.6	10.7	11.9	11.7	12.0	13.5	12.3	12.5
塩分 (ppt)	0.5m	32.4	32.4	32.6	32.3	32.9	32.8	33.0	33.7	33.6	27.6
	2m	32.4	32.4	32.6	32.4	32.9	32.8	33.1	34.0	33.8	32.9
	5m	32.4	32.4	32.6	32.3	33.0	33.0	33.1	34.4	33.9	
	B-1m	32.4	32.4	32.5	32.5	33.1	33.1	33.2	34.2	33.9	33.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	9.3	9.0	8.8	9.0	8.8	9.0	8.9	8.7	8.8	9.0
	2m	9.3	9.0	8.8	9.1	8.7	8.9	8.9	8.5	8.9	9.2
	5m	9.3	9.0	8.8	9.1	8.7	8.7	8.8	8.3	8.9	
	B-1m	9.2	9.0	8.8	9.0	8.7	8.6	8.7	8.3	9.0	9.1
珪藻類 (細胞/mL)	2m	220	10	0	50	0	0	0	70	50	0
	5m	0	0	10	0	20	10	10	0	50	0(4.0m)

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始まります。