



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【1月の概況】

- 水深2mの日平均水温は、下降傾向にあり、桃取、小浜、神明では1/17~18にかけて、10℃を下回りました。
- 珪藻類は、神明で470細胞/mL（5m）が確認され、12月の調査時と比べ増加しました。その他の地点では同程度もしくは減少しました。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日	1/20								1/14		1/20
時刻	9:26	9:58	10:10	10:21	10:35	10:43	11:06	10:50	10:28	10:47	10:40
水深 (m)	14.7	10.6	13.6	18.7	9.7	9.1	10.4	9.2	13.1	8.5	5.3
水温 (°C)	0.5m	9.8	10.8	11.3	11.0	11.0	11.4	11.1	12.3	13.1	10.2
	2m	9.9	10.8	11.3	11.0	11.0	11.4	11.1	12.7	13.2	10.2
	5m	9.9	10.9	11.2	11.1	11.0	11.4	11.0	13.0	13.0	
	B-1m	9.9	10.9	11.3	11.5	11.0	-	10.1	13.5	12.9	10.7
塩分 (ppt)	0.5m	32.6	32.9	33.1	33.0	33.0	33.2	33.1	33.8	34.2	33.8
	2m	32.6	32.9	33.1	33.0	33.0	33.2	33.1	34.0	34.2	33.8
	5m	32.6	32.9	33.1	33.1	33.0	33.2	33.1	34.1	34.2	
	B-1m	32.6	33.0	33.1	33.2	33.0	-	33.1	34.3	34.2	34.0
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	9.0	8.8	8.7	8.8	8.8	8.7	8.9	8.4	8.2	9.4
	2m	9.0	8.8	8.7	8.8	8.8	8.7	8.9	8.2	8.2	9.5
	5m	9.0	8.8	8.7	8.8	8.8	8.7	8.9	8.2	8.2	
	B-1m	9.0	8.8	8.7	8.8	8.8	-	9.4	7.8	8.1	9.4
珪藻類	2m	0	50	0	0	30	0	60	100	0	160
(細胞/mL)	5m	20	0	30	180	0	60	70	60	0	470 (4.3m)

水深B-1mとは：海底直上1mの水深です。（例：調査地点の水深が18.6mの場合、B-1mは17.6mです）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが出始めます。