



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所  
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では22～24℃台、的矢湾では24～25℃台、英虞湾では30℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、すべての海域において上下変動を繰り返しています。現在は水温が低下していますが、今後も水温の上昇に注意してください。
- 鳥羽海域、的矢湾で珪藻類が多く確認されました。



【結果】

|                 |      | 桃取    | 小浜    | 安楽島<br>高山 | 安楽島<br>上手 | 浦村<br>砥谷 | 浦村<br>小田ノ浜 | 浦村<br>大村 | 浦村<br>権現 | 的矢    | 三ヶ所   | 神明    |
|-----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 月日              |      | 9/11  |       |           |           |          |            |          |          | 9/9   |       | 9/8   |
| 時刻              |      | 9:15  | 9:36  | 9:55      | 10:08     | 10:27    | 10:34      | 11:41    | 10:43    | 13:24 | 14:24 | 10:28 |
| 水深 (m)          |      | 13.2  | 10.6  | 12.3      | 18.8      | 10.2     | 8.6        | 10.3     | 8.4      | 9.8   | 7.9   | 4.0   |
| 水温<br>(℃)       | 0.5m | 26.4  | 24.6  | 23.3      | 22.7      | 23.0     | 23.0       | 22.7     | 23.5     | 27.3  | 27.8  | 31.2  |
|                 | 2m   | 24.4  | 24.4  | 23.4      | 22.7      | 22.6     | 22.5       | 22.4     | 23.0     | 25.0  | 24.6  | 30.0  |
|                 | 5m   | 23.4  | 23.6  | 23.3      | 22.6      | 22.2     | 22.3       | 22.2     | 22.6     | 23.7  | 23.5  |       |
|                 | B-1m | 22.8  | 23.3  | 23.1      | 22.4      | 21.9     | 22.1       | 22.1     | 22.4     | 21.9  | 23.0  | 28.8  |
| 塩分<br>(ppt)     | 0.5m | 29.6  | 31.0  | 32.0      | 32.5      | 32.5     | 32.5       | 32.6     | 32.5     | 29.4  | 29.0  | 30.5  |
|                 | 2m   | 31.1  | 31.3  | 31.9      | 32.5      | 32.6     | 32.7       | 32.8     | 32.5     | 31.6  | 31.9  | 33.2  |
|                 | 5m   | 31.9  | 31.8  | 32.0      | 32.5      | 32.9     | 32.8       | 32.8     | 32.7     | 32.3  | 32.4  |       |
|                 | B-1m | 32.4  | 32.1  | 32.2      | 32.6      | 33.0     | 32.9       | 32.8     | 32.7     | 33.1  | 32.7  | 33.6  |
| 溶存酸素量<br>(mg/L) | 0.5m | 6.4   | 5.6   | 5.2       | 5.2       | 5.3      | 5.0        | 5.4      | 5.7      | 7.2   | 7.4   | 6.2   |
|                 | 2m   | 5.4   | 5.5   | 5.2       | 5.2       | 5.1      | 5.3        | 5.3      | 5.6      | 5.7   | 5.4   | 5.6   |
|                 | 5m   | 4.8   | 5.0   | 5.1       | 5.2       | 5.4      | 5.3        | 5.2      | 5.4      | 4.8   | 4.6   |       |
|                 | B-1m | 4.5   | 4.7   | 5.0       | 5.2       | 5.3      | 5.6        | 5.3      | 5.2      | 4.6   | 4.4   | 5.2   |
| 珪藻類<br>(細胞/mL)  | 2m   | 4,330 | 8,900 | 5,050     | 1,280     | 710      | 1,920      | 780      | 1,930    | 1,120 | 1,410 | 0     |

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが始まります。