



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域で8~10℃台、的矢湾で10℃台、英虞湾では9℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、2月上旬に最低値を記録しました。今後は、気温の上昇に伴い、水温も緩やかに上昇していくと見込まれます。
- 珪藻類は全体的に少なく、最も多いところでの的矢の400細胞/mLとなりました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		2/10								2/18	2/16	
時刻		9:14	9:30	9:48	9:58	10:12	10:21	10:45	10:29	13:30	14:39	10:09
水深 (m)		14.9	10.6	13.1	17.4	9.9	8.9	10.9	9.1	10.4	8.5	4.9
水温 (°C)	0.5m	7.9	8.1	8.5	10.2	9.4	9.4	9.5	8.2	11.0	10.9	9.9
	2m	8.0	8.1	8.5	10.3	9.4	9.4	9.5	8.2	10.9	10.8	9.7
	5m	8.1	8.1	8.5	10.3	9.4	9.3	9.6	8.5	10.8	10.8	
	B-1m	8.7	8.4	8.8	10.7	9.0	9.0	10.2	8.7	10.9	10.8	9.5
塩分 (ppt)	0.5m	32.8	32.9	33.0	33.7	33.4	33.5	33.5	33.2	33.9	33.9	33.8
	2m	32.8	32.9	33.0	33.7	33.5	33.5	33.5	33.2	33.9	33.9	33.8
	5m	32.8	32.9	33.0	33.8	33.5	33.5	33.5	33.3	34.0	33.9	
	B-1m	33.1	33.0	33.1	33.9	33.5	33.5	33.8	33.4	34.0	34.0	33.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	9.6	9.4	9.3	8.8	9.1	9.1	9.1	9.7	10.3	10.0	9.5
	2m	9.6	9.4	9.3	8.8	9.2	9.1	9.1	9.8	10.2	10.1	9.7
	5m	9.5	9.4	9.3	8.8	9.2	9.1	9.0	9.5	10.0	10.3	
	B-1m	9.3	9.3	9.3	8.7	9.5	9.2	8.9	9.4	9.9	10.5	9.7
珪藻類 (細胞/mL)	2m	360	40	230	150	310	90	310	110	400	90	0

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。