


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では22～23℃台、的矢湾では23℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、全地点で22～23℃台になっています。昨年度同時期に比べて、1～2℃低い状態で推移しています。
- 珪藻類は鳥羽海域北部で多く、桃取では10,000細胞/mL以上が確認されています。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 権現	浦村 大村	的矢	三ヶ所
月日		7/8								7/7	
時刻		9:08	9:22	9:47	9:56	10:14	10:21	10:42	10:27	14:43	14:03
水深 (m)		14.1	10.1	14.0	18.6	9.9	8.7	8.8	10.6	10.4	8.3
水温 (℃)	0.5m	23.9	23.5	22.3	22.6	22.9	22.7	23.3	22.9	24.5	23.9
	2m	23.3	22.6	22.3	22.4	22.6	22.6	22.5	22.4	23.2	23.4
	5m	21.8	21.7	22.0	22.0	22.2	22.4	22.2	22.3	22.4	22.5
	B-1m	21.1	21.3	21.8	21.9	22.1	22.1	21.9	22.0	22.1	22.1
塩分 (ppt)	0.5m	19.7	24.5	28.2	29.3	28.4	29.0	27.0	28.4	18.1	24.7
	2m	23.4	26.2	29.0	30.0	29.4	29.9	29.3	29.4	28.9	28.5
	5m	28.3	29.6	30.0	30.8	30.4	30.7	30.9	30.2	31.1	30.7
	B-1m	31.6	30.9	31.2	31.6	31.1	31.1	31.3	31.3	32.2	31.9
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	8.3	6.6	5.5	6.0	5.6	5.3	5.7	5.6	7.9	7.2
	2m	6.9	5.8	5.6	5.8	5.3	5.2	5.5	5.3	6.0	6.0
	5m	4.3	4.3	5.3	5.5	5.2	4.9	4.8	5.5	4.7	4.2
	B-1m	3.7	3.9	5.1	5.3	5.3	5.0	3.9	4.7	5.2	3.2
珪藻類 (細胞/mL)	2m	12,470	7,530	1,660	2,480	1,050	130	680	480	620	640

水深B-1mとは：海底直上1mの水深です。(例：調査地点の水深が18.6mの場合、B-1mは17.6mです)

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが出始めます。