



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協
鳥羽市農水商工課、同市水産研究所
志摩市産業振興部水産課、三重県

【概況】

- ・ 鳥羽市管内と的矢湾で、8月中下旬にかけて水温が上下に大きく変動しましたが、9月以降は概ね安定し、現在は26℃前後で推移しています。
- ・ 神明の溶存酸素量が低下しています。
- ・ 珪藻類は、鳥羽市管内は増加又は減少、的矢湾、英虞湾ともに増加しました。



【結果】

	桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ 浜	浦村 大村	的矢	三ヶ所	神明	
月日	9/15						9/17	9/17		9/23	
時刻	14:42	15:06	15:28	15:44	16:05	16:24	14:36	10:50	10:20	10:20	
水深 (m)	20.8	10.0	16.9	26.2	9.7	9.2	10.4	9.2	7.7	5.6	
水温 (°C)	0.5m	26.6	26.8	26.0	26.3	26.5	26.4	26.3	27.0	26.8	26.6
	3m	26.4	26.5	26.0	26.2	26.4	26.3	25.4	27.0	26.9	26.8
	5m	26.3	26.0	26.0	26.1	26.3	26.2	25.2	26.9	27.0	26.4
塩分	0.5m	25.4	25.9	28.2	27.9	27.8	27.7	28.7	28.4	27.7	31.8
	3m	26.5	26.4	28.5	28.1	27.9	27.8	29.6	29.3	29.2	33.1
	5m	26.9	28.2	28.5	28.2	28.0	27.9	29.5	30.1	30.0	33.3
溶存酸素量	0.5m	7.6	7.6	6.9	7.2	7.6	7.5	6.1	4.8	6.4	5.6
(mg/L)	3m	7.3	7.2	6.7	7.1	7.4	7.3	5.8	4.8	5.9	3.4
	5m	7.1	5.7	6.7	7.0	7.1	7.3	5.8	4.3	5.6	2.9
珪藻類 (細胞/ml)											
・ 水深3mの細胞数	1,700	4,520	1,580	3,420	1,860	2,680	120	4,284	881	570	
・ 二枚貝の餌になる											

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが始まります。

特記事項：